


ORNITHOLOGISKE UNDERSØGELSER
I VESTJYLLAND 2.



Esben Donnerborg

Tage Holdgaard Andersen.

FORORD.

Hermed foreligger den anden rapport fra "Ornithologiske Undersøgelser i Vestjylland" (OrnUV). Vi er glade for, at vor opfordring om yderligere tilsendelse af iagttagelser fra nye og gamle observatører er blevet taget til efterretning, og vi vil gerne benytte lejligheden til at udtrykke ønsket om et fortsat godt samarbejde i de kommende år.

De, der modtog vor første rapport, ville se, at der var mange og store huller i vor viden, hvilket skyldtes det ret spinkle materiale - men som alt andet måtte også denne undersøgelse have sin begyndelse.

Vi har siden sidste års rapport foretaget en ændring i formen for fremlæggelsen af materialet, idet vi nemlig har kørt oplysningerne op på artsbasis i stedet for lokalitetsbasis. Denne ændring skyldes, at vi på grund af det store materiale indkommet i 1971, fik talrige iagttagelser ind fra ikke-deciderede fuglelokaliteter, hvorfor en lokalitetsliste på dette grundlag ville blive uoverskuelig og forvirrende. Hermed ikke sagt, at der ingen lokalitetsliste kommer. - Det er nemlig vor hensigt at udsende en sådan indenfor de nærmeste år.

Foruden indsendte iagttagelser er der brugt oplysninger fra H.P.Hansens konservatorprotokoller (1907-1938) (HPH), fra Herning Museums fuglesamling (HM) og selvfølgelig mange af vore egne observationer.

Heller ikke her skal vi undlade at opfordre alle til at indsende alle deres iagttagelser. Selv det, der synes som en bagatel i Deres øjne, kan have betydning. - Derfor send ind.

De, der måtte ønske yderligere information om undersøgelserne og deres art, er velkommen til at skrive til en af undertegnede

Esben Donnerborg
Gadegaardsvej 38,
7400 Herning.

Tage Holdgaard Andersen,
Grønnegade 48,
7400 Herning.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke følgende for det tilstillede materiale:

Harry Andersen (HA), Jens Ballegaard (JB), Bitten Bolet (BB), Henning Bøgild (HB), Thorkild Bøgeild (TB), J.Hedegaard Christensen (JHC), Aage Christensen (HC), Erling Clausen (EC), Niels Erik Franzmann (NEF), O.Hestehave (OH), Christian Hjorth (CH), K.E.Jakobsen (KEJ), Anker Jensen (AJ), Kurt Lunde (KL), Holger Moskjær Madsen (HMM), Mogens Madsen (MM), Ejner Nielsen (EN), A. Gleerup Sørensen (AGS), Tom Vestergaard (TV).

Herning, den 20. Februar 1972.

Esben Donnerborg

Tage Holdgaard Andersen.

Undersøgelsesintentioner.

Ornithologiske undersøgelser i Vestjylland blev startet i visheden om at den hidtil indhøstede viden om fuglelivet var minimal. - Dette kunne vi forvise os om gennem studier af den ornithologiske litteratur, og vi fandt det derfor naturligt at gøre vort til at billedet af Danmarks fugleliv blev mere fuldstændigt.

Gennem indsendte og egne iagttagelser har vi nu i over eet år arbejdet med projektet, og vi har allerede i dette korte tidsrum fundet mange interessante ting frem, såsom iagttagelser af meget sjældne arter, hvis tilstedeværelse i Vestjylland slet ikke har været kendt tidligere.

Under arbejdet er vi endvidere stødt på flere problemer om bl.a. økologiske forhold og fysisk-geografisk indvirkning på ændringer i fuglefaunaen. - Disse forhold har vi formuleret i efternævnte undersøgelsesintentioner, af hvilke resultaterne sammen med de øvrige oplysninger fra undersøgelser vil foreligge om 2-3 år i en tildels afsluttende bog.

Undersøgelsesintentionerne er som følger:

1. Grunde til arts- og bestandsændringer, set ud fra ændringer i biotoper manifesterende sig som afvandinger af søer og moser, eller kanalføringer af åer (Skjern Å), beplantninger af heder, anlæggelse af større forstyrrende vejanlæg, fremkomsten af brunkulslejer og deres senere beplantning, omlægninger i agerlandet (mere intensive dyrkningsmetoder).

Hertil de meget farlige ændringer, som forureningen medfører for de forskellige fuglelokaliteter, primært vandforureningen og giftforureningen forårsaget af landbrugets anvendelse af gifte.

2. Klimaets indvirkning på arts- og bestands sammensætningen. Herunder belysningen af arters forsvinden, indvandring eller genindvandring.

3. Specielle undersøgelser over koloniserende arter, østligt forekommende arter med ekstrem vestgrænse i undersøgelsesområdet, arter snævert knyttet til de vestjydske hedeområder og indlandsiagttagelser af oceanfugle.


Det skal anføres, at Vestkysten (Klitlandet og fjordene) ikke er medtaget i undersøgelsesområdet, da oplysninger om fuglefaunaen her allerede foreligger publiceret og er af ret betydeligt omfang.

En indlemmelse af dette område ville have givet en skæv fordeling i vort materiale.

Til slut skal vi gøre opmærksom på, at undersøgelsen intet har med ATLAS projektet at gøre, udover at disse supplerer hinanden med visse og kun visse kvalitative oplysninger.

Vor undersøgelse er primært af kvantitativ art. -
ATLAS kun af kvalitativ art

KORT OVER UNDERSØGELSESMRÅDET



Mørke områder: vand
 Skraverede ---: plantager.

Artsgennemgang:

Sortstrubet lom (*Gavia arctica*)

1 ad. hun i vdr. Sunds Sø 16.1.1920 (HM).

Islom (*Gavia immer*).

1 ex. fra Ulfborg den 19.11.1920 (HPH).

Rødstrubet lom (*Gavia stellata*).

1 ad. hun fra Kollund v. Herning den 17.10.1920 (HM).

Toppet lappedykker (*Podiceps cristatus*).

Mange oplysninger er kommet ind om denne art efterhånden som jagttager-nettet er blevet udvidet.

Gødstrup Sø er der den 15/9-68 og 20/3-71 set 14 ex. sandsynligvis træk. Sommeren 1971 igennem er der set 2-4 ex. konstant, arten yngler højst sandsynlig med 2 par. NEF angiver at der i 1965 har været 14-15 ynglepar. Det kraftige fald i antallet må tillægges den stigende forurening af søen. Endvidere ynglende i Hald Sø og Søby Sø. I sidstnævnte minimum 3 ynglende par. På denne lokalitet ses den endvidere til langt ud på efteråret og meget tidligt i foråret. Arten synes kun at være fraværende, når søen er tilfrosset. Ses også i den bagved liggende Kulsø. Angives som ynglefugl i Kragssøen af MM.

Endvidere er den en regelmæssig trækfugl på flere egnede lokaliteter, såsom Sunds Sø (hvor den tidligere har ynglet) Kragssøen, Knudmose, Ved Sø, Nørre Sø og Sønder Sø, med størst antal i Nørre Sø (79 den 25/8-1968)

Gråstrubet lappedykker (*Podiceps griseigena*)

Ikke så almindelig som ovennævnte art. Dog ses påfaldende mange ex. i Kragssøen, således 6 ex. den 21/4-71 og 4 ex. den 16/7-71. Arten angives af Mogens Madsen at være ynglende her og af O. Hestehave angives der at være 3 ynglepar m. rede i 1971. (1 rede plyndret). Endvidere ses den oversomrende i Søby Sø. Skal have ynglet her med 2-3 par i 1964-65. I Knudmosen er 1 ex. set i foråret 1969 og 1970.

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*).

Sjælden i området, da den fortrinsvis er knyttet til Kyst- og fjordområder i træktiden. Kun 2 ex. fra Kragssøen 6/5-1970

Sorthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*).

Søby Sø 1 par skulle have ynglet i 1965 (NEF). 3 par i søen den 12/5-1970, 4 ex. set den 7/5-1971. Er set i Kragssøen i 1971 bl.a. med 2 ex. 14/5-71 (OH). Først i 60erne i Knudmosen, i 1965 2 par i Gødstrup Sø.

Lille lappedykker (*Podiceps ruficollis*).

1 par har ynglet i Knudmosen fra 1961-65 og fra 1967-69, hvorefter arten ikke er set. I Søby Sø har den ynglet i 1965 ellers ses den fortrinsvis fouragerende i efterårsmånederne. Observeret i Kragssøen den 21/4-1970. Har ynglet i Gødstrup Sø i 1971, pull. set. En del ex. overvintrer i egne åer, fortrinsvis Karup Å og Rind Å (OH, NEF). Arten overses nok ofte på grund af dens biotop, levevis og udseende.

Malleuk (*Fulmarus glacialis*).

1 ad han Tarp ved Sdr. Felding 26.11.1944 HM.

Stor stormsvale (*Oceanodroma leucorhoa*).

1 juv. hun Gjelleruplund 17.10.1926 (HM).

Topskarv (*Phalacrocorax aristotelis*).

1 ad hun Gjellerup ved. Herning 16/1-1924 (HM).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*).

Fouragerer året igennem i Omme Å i skydeterrænet ved Borris. Fuglene kommer fra en koloni nord for laksetrapperne. Op til 20 ex. set på Harrild Hede. Ungfugle set i Dollerup-kolonien nær Finnerup i 1970. 6 ex. ved Hald sø den 3/2-1970. 1 ex. i Knudmosen efteråret 1970. Fiskehejrekolonien i Ravnstrup 20-25 par den 10. april 1970. Flere ex. set fouragerende ved Kragssø 1971 (MM)

Kohejre (*Ardeola ibis*)

1 ad. han Skjern den 23/11-1934 (HM).

Dværghejre (*Ixobrychus minutus*).

1 juv. hun Knudmosen 1.8.1957 (HM)

Rørdrum (*Botaurus stellaris*).

4 ex. fra Ulfborg i tiden 1914-1921 (HM og HPH). Hertil 1 ex. fra Naur ved Holstebro den 11/8-1921 og 1 ex. fra Skjern den 2/11-1921.

Hvid stork (*Ciconia ciconia*).

Storkeparret i Borris fik i 1971 3 pull. på vingerne (HA) 1 ex. 24/5-69 ved Ørnghøj. I Skjern 1 ynglende par i 1970 og 1971 (JHC).

Knopsvane (*Cygnus olor*).

Veståen (Borris) 1968 7 ynglepar. Søby Sø 25 ex. 14/10-70 og 18 ex. 14/10-68. Minimum 2 ynglepar i søen. Ved Sø 2 ex. 1/7-70. Sunds Sø i den sene efterår ses flere ex. af arten. 1 Par yngler. Rind Å 2 par ynglende. Kragssøen 2 ynglepar 1969-70. Gødstrup Sø få trækkende ex. 1 ynglepar i Knudmosen siden 1961. Sandfeldt brunkulsleje 1 par 1971.

Sangsvane (*Cygnus cygnus*).

 Talrige som trækgest ved Gødstrup, bl.a. den 7/11-1971
 34 ex. den 6/11-71 og 14 ex. 23/1-1971 (BB).
 Søby Sø 22 ex. den 20/2-1971 og 2 ex. den 23/3-1971.
 I kulgrav ved Søbygaard 4 ex. 1970.

PIBESVANE (*Cygnus bewickii*).

 Gødstrup Sø 37 ex. den 19/3-1961. Den største flok, der er set
 her i 60 erne og 70 erne. Endvidere 10 ex. den 6/11-71. I
 Søby Sø, hvor den er talrigt repræsenteret i efteråret.

GRÅGÅS (*Anser anser*).

 I Søby Sø 10 ex. den 18/4-71, Ædr. Anlæg Herning 1 par den
 30/7-65. Ses ellers kun overtrækkende i flokke af højst
 20 ex.

KORTNÆBBET GÅS (*Anser f. brachyrhynchus*)

 Knudmosen Herning: 1 juv. hun den 24/9-1919. (HM)

SNEGÅS (*Anser caerulescens*)

 I Søby Sø 2 ex. fra den 8/4-12/4-71. (TV)
 Eneste iagttagelse fra undersøgelsesområdet overhovedet.

GRAVAND (*Tadorna tadorna*).

 Er iattaget mange steder, både ynglende og trækkende.
 I Veståen ved Borris max. 15 ex. (1968) min. 2 ynglepar ved
 Borris. Gødstrup Sø 4 ex. den 15/9-1968. På denne lokalitet
 3-4 ynglepar - 44 ællinger set i 1971. Bemærkelsesværdigt
 stort antal ex. (40) den 3/6-1971. Karup Å 5 ex. 24/4-1970.
 Sdr. Resen 4 ex. 27/3-1970. Kragssøen 1 ex. den 11/2-1970.
 1 ynglepar i Karup Å ved Karup. (Pull. set) I Sunds Sø
 12 ex. den 19/3-1969. I Hald Sø max. 64 ex. trækkende
 i 1968. I Ved Sø 13 ex. i efteråret 1968. I Nørresø 1968
 4 ex. (ynglende?). Arten formodes at yngle ved Gudum Kær
 8 km nord for Herning. Søby Sø 60 ex. den 20/2-1971.

GRÅAND (*Anas platyrhynchos*).

 Meget almindelig ynglefugl i hele undersøgelsesområdet:
 Skydeterrænet ved Borris 20 ynglepar 1969, i Sunds Sø 3 par
 1971, hertil ca. 20 par, der dog må regnes samme tamønder.
 I Knudmosen ca. 10 par 1971, i Søby Sø 1971 ca. 4 par (forholds-
 vis lille bestand) I Gødstrup Sø årligt max. 10 par.
 Endvidere overalt ved åer og mergelgrave og i moser.

Talrig som trækkende: Vandkraftsøen i Holstebro 50 ex. 1968.
 Veståen Borris: 1350 ex. i efteråret 1968, i Søby Sø ca.
 1000 ex. den 18/11 1968, i Gødstrup Sø 12 ex. den 15/9-1968.
 i Sunds Sø 380 ex. den 16/12-1968. I efteråret 1968 endvidere
 max. antal på følgende lokaliteter: Ved Sø: 40, Nørre Sø: 100,
 Søndersø 265, Hald Sø 1000.

KRIKAND (*Anas crecca*).

 Følgende ynglelokaliteter bør nævnes: Borris Hede med tilhørende småsøer, damme og åsystemer: max. 15 ynglepar. Rind Å: 2-4 par, Knudmosen: 2-3 par, Hvidmose ved holstebrø: 2-3 par, Revling Mose vest for Give: 1 par, Harrild Hede: (parantal ?)
 Af større trækobservationer skal nævnes:
 Veståen Borris: max 450 ex. i efteråret 1968.
 Gødstrup Sø: 2 ex. den 15/9-1968, 5 ex. den 15/9-71.
 Ved Sø: 2 ex. efteråret 1968.
 Søby Sø: den 10/10 1971 30 ex, 25-40 ex. den 17/7-70, 22 ex. den 22/2-1971.
 Hedeområdet ved Tim: 6 ex. efteråret 1970.
 Knudmosen: 10 ex. 15/9-71.

ATLINGEAND (*Anas querquedula*).

 Gødstrup Sø: hvert år i sensommeren og det tidlige forår max. 10 trækkende ex. Påfaldende mange observationer af krikand sammenlignet med de få indkomne iagttagelser af atlingeand synes at indicere, at atlingeand ofte tages for krikand. -
 Vi opfordrer derfor alle iagttagere til at være opmærksom på denne art.

PIBEAND (*Anas penelope*).

 Vest Åen Borris: 3 ex. efteråret 1968.
 Sunds Sø: 3 ex. 15/9-1968, 15 ex. den 18/11-1968.
 Ved Sø: 2 ex. efteråret 1968.
 Hald Sø: 4 ex. efteråret 1968.
 Ved Thorsted: max. 10 rastende ex. i 1967 og 1968. (JB)
 Søby Sø: 150 rastende ex. 25/10-1970. 150 -250 ex. 17/10-70. 2-300 ex. den 15/11-1970.

SPIDSAND (*Anas acuta*).

 Gødstrup Sø: 1 ex. 15/9-1971.
 Knudmosen: 1 afslaaet par den 6/5-1960. (eneste indkomne iagtt.)

SKEAND (*Spatula clypeata*).

 Almindelig på træk på alle egnede lokaliteter.
 Sønder Sø: max. 15 ex. efteråret 1968.
 Kragssøen: 1 par den 19/4-1970. 2 trækkende ex. den 12/5-1971.
 Søby Sø: 4 ex. 22/8-1971.
 Gødstrup Sø: 6 ex. den 9/5-1971.
 Oplysningerne om arten som ynglefugl mangler.

TAFTELAND (*Aythya ferina*).

 Sønder Sø: 2 ex. efteråret 1968.
 Kulsøen ved Troldhede: - 2 ex. den 15/2-1971, 1 ex. 26/3-1971.
 Gødstrup Sø: hvert år 6-10 oversomrende ex. (NEF) 12 ex. 20/3-1971.
 Søby Sø: næsten altid 20-25 ex., 125 ex. 22/6-1971, 50 ex. den 10/10-71.
 Arten formodes at yngle i Søby Sø.
 KNUDMOSEN: 2 hun og 1 han den 1/7-1966.

TROLDAND (*Aythya fuligula*).

 Vandkraftsøen Holstebro: 11-27 ex. i efteråret 1968.
 Veståen ved Borris: max. 75 ex. efteråret 1968.
 Ved Sø: 8 ex. efteråret 1968.
 Kulsøen ved Troldhede: 4 ex. den 26/3-1971.
 Karup Å: ved Sdr. Resen: uspecificeret antal vinteren 1970.
 Kragssøen: 10 ex. 6/5-1970, 10 ex. 8/8-1970, 1 par 14/4 og 19/4-70.
 3 ex. den 3/4-1970
 Gødstrup Sø: op til 200 ex. i vintermånederne (NEF) 30 ex. 6/11-71.
 Søby Sø: 25 ex. den 26/9-1971.

BJERGAND (*Aythya marila*).

 Ved Sø: 8 ex. efteråret 1968.
 Gødstrup Sø: 1 han 25/12-1961. 1 han 3/1-1964, 3 ex. efteråret 1971.

HVINAND (*Bucephala clangula*).

 Sunds Sø: 2 ex. 20/4-1969.
 Hald Sø: 15 ex. efteråret 1968.
 Kulsøen ved Troldhede: 10 ex 15/2-1971. 8 ex. 26/3-1971.
 Kragssøen: større flokke af 30-40 ex. sensommeren 1968
 10 ex. 11-1970, 10 ex. 6/5-70, 10 ex. 3/8-70.
 Søby Sø: 4 ex. 20/9-70, 40-50 ex. 23/3-71.
 Gødstrup Sø: 35 ex. 20/3-1971.
 Sønderager ved Herning: 1 ex. nytaar 1971. I samme tidsrum
 flok på 30 ex. i luften over Herning. (KL)

SORTAND (*Melanitta nigra*)

 Kulsøen ved Abildå: 1 han 1/7-71
 Knudmosen: 2 han plus 1 hun 9/4-1968. 1 han plus 1 hun 14/4-68.
 2 han plus 2 hun 25/4-1968.

STOR SKALLESLUGER: (*Mergus merganser*).

 1 adult. han i yngledragt fra Skjern den 6/2-1922. (HM)
 Kulsøen ved Troldhede: 7 ex. 15/2-1971, 10 ex. 26/3-1971.

TOPPET SKALLESLUGER (*Mergus Serrator*)

 6 ex. i Søby Sø den 18/4-1971 (BB)

LILLE SKALLESLUGER (*Mergus albellus*)

 Herning: 1 ex. 17/11-1920 (HPH).

KONGEØRN (*Aquila chrysaetos*)

 Ikast: 1 ex. 20/12-1937 (HPH)
 Birkebæk Plantage: 1 ex. januar 1966. (NEF)

MUSVÅGE (*Buteo buteo*).

 3 par yngler på Borris Hede.
 Lilleå og Stråssø plantage ved Ørnghøj: 1 par set i yngletiden 1967
 1968 og 1969. (formentlig yngl.)
 Egeris Skov ved Troldhede: 1 par ynglende i 1970.
 Birkebæk Plantage: antallet af ynglepar sat for højt i OrnUV I.
 rimeligvis ca. 10 ynglepar.

MUSVÅGE fortsat.

 Hyppige som trækkende og rastende:

Hammerum: 11 ex. 30/5-1971,

Kragsøen: 1 ex. 30/4-1970.

Søby Sø: 1 ex. 7/5-1971, 1 ex. 26/9-1971.

Endvidere hyppig som trækgæst i Høgild Birkebæk.

Knudmosen: 1 ex. ses af og til både sommer og vinter.

VINTERMUSVÅGE (*Buteo lagopus*)

 Høgild Birkebæk: 2-3 ex. hver vinter. (NEF)

RØD GLENTE (*Milvus milvus*).

 Avlum v. Herning: 1 ex. 6/8-1934 (HPH)

HAVØRN(*Haliaeetus albicilla*).

 Dejbjerg: 1 ex. 9/11-1926 (HPH)

HVEPSEVÅGE (*Pernis apivorus*).

 Tarm: 1 ex. 22/9-1920.

Ingen iattagelser indkommet fra de sidste årtier.

RØRHØG (*Circus aeruginosus*).

 Kibæk: 1 adult. han 19/4-1948 (HM)

BLÅ KÆRHØG (*Circus cyaneus*).

 Søby Sø: 1 ex. 16/10-1971 (BB)

Hedeområde ved Troldhede: 2 han 3/11-1971 (CH)

STEPPEHØG (*Circus macrourus*).

 Herning: juv-ad. 1/5-1946 (HM)

HEDEHØG (*Circus pygargus*).

 Særdeles mange ex. fra 1908-1937 fra området (HPH)

Undersøgelser herover vil foreligge om godt et halvt år i særtryk.

Borris Hede: 1 par iagttaget den 2/7-1967. Ynglepar ?

Tidligere i Hvidmose ved Holstebro.

Ellers ingen nyere iagttagelser.

DUEHØG (*Accipiter gentilis*).

 Borris Hede: 1 par

Høgild Birkebæk: 2 par , 1 ad.hun 2/12-1960 (HM)

SPURVEHØG:(*Accipiter nisus*).

 Høgild Birkebæk: 10-15 par

Grusgrav ved Karup: 1 ex. 7/2-1970

Ved Karup Å : 1 ex. 17/1-1970.

Søby Sø: 1 ex. 26/9-1971.

Knudmosen: ret almindelig. om vinteren.

Høge fortsat.

Oplysninger savnes i udstrakt grad om de to høgearter.

FISKEØRN (*Pandion haliaetus*)

Sunds Sø: 2 ex. trækkende mod syd 12/9-1965.
Høgild Birkebæk: 1 ex. 3/10-1965. 1 ex. 3/8-1968, 1 ex. 28/9-71 (EN)
Harrild Hede: ses af og til.
Flyvestation Karup: 1 ex. fløjet ned 24/8-70.
Kragsoen: 2 ex. 30/8-1970.

JAGTFALK (*Falco rusticolus*).

Viborg: 1 ex. af grønlandsk jagtfalk (*Falco r. candicans*)
November 1912 (HPH)
1 ex. af grønlandsk jagtfalk marts 1913 (HPH)
Holstebro: 1 ex. islandsk jagtfalk (*Falco r. islandus*)
November 1916 (HPH)

VANDREFALK (*Falco peregrinus*)

Mange ex. fra 1908-1937 (HPH)
Undersøgelsesresultater vil foreligge senere.
Knudmosen: 1 juv. ex. 8/2-1969.
Eneste indkomne iagttagelse fra de seneste årtier.

LÆRKEFALK (*Falco subbuteo*).

Ravnstrup v. Viborg: 1 ex. juni 1914 (HPH)
Isenvad v. Ikast: 1 ex. 28/8-1917 (HPH)
Holstebro: 1 ex. 7/5-1918 (HPH)

DVÆRGFALK (*Falco columbarius*)

Mange ex. fra området 1908-1937.
Her skal blot nævnes 1 juv. ex. Knudmose 25/10-1921. (HPH)

AFTENFALK (*Falco vespertinus*)

4 ex. fra området fra 1908-1937. Bl.a. 1 juv. hun
fra Vildbjerg 1/10-1909. (HPH)

TÅRNFALK (*Falco tinnunculus*)

Lund Mølle Herning: Rede med 5 unger sommer 1970 og 1971.
Ved åsystemerne og i skovene ved Høgild Birkebæk: ca. 10 par.
Karstoft å: max. 5 par.
Borris Hede: max. 10 par.
Ved Ølgod: 2 par.
Ved Sinding: 2-3 par.
Knudmosen: 1 par.
Jævnt ynglende i vestjydske læhegn.
Videbæk: 2 par.
Flyvestation Karup: 5-6 par.

GROUSE (*Lagopus lagopus scoticus*).

 Den sidste fugl fra en ynglebestand i trekantområdet
 Herning-Silkeborg-Brande blev skudt ved Ikast den 16/11-1932
 Det drejede sig om 1 ad. han.

URFUGL (*Lyrurus tetrrix*).

 Borris Hede: 50 spillende kokke set. Bestanden er på ca. 200
 ex. af begge køn.
 Hvidmose øst for Holstebro: 5-10 kokke (ynglende ?)
 Indsande 3 km n.f.Thorsted: 2-3 spillende kokke, 1 høne iagttaget
 1 høne + 1 hane den 25/10-70.
 1 hane den 29/12-1970 (EC)
 Karup Flyvestation: er tiltagende på dette område. 40-80 ex.
 12 kokke på skogreplads v. Hedelund.
 1 høne set m. 8 pull. sommeren 1971.
 OH har imidlertid anslået flyvestationens
 bestand til højst en snes ex.

TJUR (*Tetrao urögallus*).

 Overisen v. Ikast: 1 ex. 27/9-1921 (HPH)

AGERHØNE (*Perdix perdix*).

 Efter de mange indkomne oplysninger at dømme en jævnt udbredt
 og alm. ynglefugl omend den er aftaget lidt i de senere år,
 grundet landbrugets mere intensive dyrkningsmetoder.
 En samlet talangivelse over Vestjyllands ynglebestand vil
 foreligge om et par år.

VAGTEL (*Coturnix coturnix*).

 Tulstrup: 1 juv. hun 1/10-1931 (HM)
 Troldhede: 1 ad. han 17/5-1936 (HM)
 Sædding v. Skjern: set med kyllinger i 1970.

FASAN (*Phasianus colchicus*).

 Som agerhøne almindelig.
 Yngle-biotoperne synes at være ret forskellige.
 Samlet talangivelse for denne art vil ligeledes foreligge
 om et par år.

VANDRISKE (*Rallus aquaticus*).

 Herning: 1 juv. han 11/9-1928 (HM)
 Knudmosen: 2 ex den 20/1-1970.

PLETTET RØRVAGTEL (*Porzana porzana*).

 Hørt fløjte på 2 lokaliteter i Høgild-Birkebak plantage langs
 Rind Å. Iagttaget 1959-63 (NEF).
 Høgildgård: 1 hørt 1960.

ENGSNARE (*Crex crex*).

 Knudmosen: 12 ex. fra 1908-37 (HPH)
 Hørt flere gange i begyndelsen af 60 erne.

GRØNBENET RØRHØNE (*Gallinula chloropus*).

 Gudum Kær n. f. Herning: 1-2 par.
 Videbæk: 9-12 par (CH)
 Kragssøen: 2 ynglepar.
 Knudmosen: 10-15 par.
 Søby Sø: 3-4 ynglepar.
 Gødstrup Sø: ca. 5 par.

BLISHØNE (*Fulica atra*).

 Meget almindelig på træk og som overvintrende.
 Veståen v. Borris: max. 40 ex.
 Gødstrup Sø: ca. 200 ex. 6/11-1971.
 Sunds Sø: 6 ex. 18/11-1968. 1 par ynglende 1971.
 Vedsø: max. 56 ex. 1968.
 Nørre Sø: max 75 ex. 1968.
 Sønder Sø: max. 130 ex. 1968.
 Hald Sø: max. 900 ex. 1968.
 Kragssøen: 26 ex. 14/4-70, max. 10 par.
 Knudmosen: max. 25 rastende, 8-10 par ynglende.
 Ved Videbæk: 1 par.
 Kulsøen Troldhede: 5 ex. 26/3-71.
 Søby Sø: 8-10 ynglepar.

For alle vandhønsarterne anbefaler vi på det kraftigste at foretage natekskursioner i yngletiden m.henblik på stemmeytringer.

STRANDSKADE (*Haematopus ostralegus*).

 Enkelte sommer- og trækgæster v. søer og åer.
 Gødstrup Sø: 1 ex. 9/5-71.
 Søby Sø: 1 ex. 1971.
 Ret hyppig gæst v. Skjern Å omkring Borris og vestpå.
 Måske enkelte ynglepar her.

VIBE (*Vanellus vanellus*).

 Meget almindelig i Vestjylland som ynglefugl. Ynglebiotoper synes først og fremmest at være flade ikke intensivt dyrkede marker eller enge i nærheden af fladvandede søer og damme, oftest i forbindelse med åsystemer.
 Store flokke i sensommeren, undertiden 3-400 ex.

STOR PRÆSTEKRAVE (*Charadrius hiaticula*).

 Uregelmæssig og fåtallig som trækgæst ved damme og søer i området.
 Sunds Sø: 1 ex. 16/7-66.
 Knudmosen 1 ex. 7/8-67.
 1 eller få ex. endvidere iagttaget i Revling Mose, og Søby Sø, hvor den yngler i brunkulslejerne.
 Skulle have ynglet med 1 par v. Gudum Kær nord for Herning fra 1958-61 (NEF)

LILLE PRÆSTEKRAVE (*Charadrius dubius*)-----
Set v. Søby Sø.HJEJLE (*Pluvialis apicaria*).-----
Knudmosen: enkelte i sensommeren. Dog ikke hvert år.
Hammerum-Ikast: på markerne 25 ex. 14/9-69.
Øst for Videbæk: 50-100 ex. 29/10-71 (CH)
Karup på pløjemarkerne: ses ofte her.
Kibæk: 194 ex. 6/11-1971 (AJ)
Søby Brunkulslejer: yngede muligvis her i 1958.POMERANSFUGL (*Eudromias morinellus*).-----
Mange ex. fra 1908-37 (HPH)
Sunds: 1 juv.han. 4/5-1913 (HM)
Ingen nyere iagttagelser.DØBBELTBEEKKASIN (*Gallinago gallinago*).-----
Meget almindelig overalt i moser, enge, ved damme og åer.
Talangivelse vil foreligge om ca. 2 år.TREDÆKKER (*Gallinago media*).-----
En del fra 1908-37, bl.a. 1 ad.han. Tarm 5/9-1923 (HM)ENKELTBEEKKASIN (*Lymnocyptes minimus*)-----
Herning: 1 ad.han 8/11-1929 (HM)
Karup å nær Karup: 1 ex. 28/12-70.
Knudmosen: set (NEF)SKOVSNEPPE (*Scolopax rusticola*).-----
Knudmosen: 1 ex. 28/6-1971.
Høgild-Birkebæk: yngler her.STOR REGNSPOVE (*Numenius arquata*)-----
Knudmosen: 11 ex. 17/4-1969.
Borris Hede: 11 ex. 26/7-69, yngede her med 10-20 par.
Hvidmose v.Holstebro: 4-5 par.
Ørre: 2 ynglepar (TB)
Videbæk: 1 par, 3 ex. 9/7-71, 8 ex. 2/8-71. (CH)
Karup flyvestation: 10-15 ynglepar, 3 par i 1971 (OH)
Ses ofte på træk på denne lokalitet. Arten synes at være ret almindelig ynglefugl på egnede lokaliteter, og at forekomme regelmæssigt som trækfugl i mindre flokke.LILLE REGNSPOVE (*Numenius phaeopus*).-----
Karup: 9 ex. trækkende mod N. 27/5-71 Kl.0900 (MM)
Eneste indkomne iagttagelse.STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*).-----
Borris Hede: 1 par m. unger 1966.

SVALEKLIRE (*Tringa ochropus*).

Ses enkeltvis eller i små flokke overalt i Vestjylland i sensommeren. Trækbiotoper er primært fladvadede amme i forbindelse med moser og åløb. Blander sig gerne med små tinksmedflokke. Samlede træktal pr. år vil foreligge senere. Gødstrup Sø: 20-25 ex. (NEF)

TINKSMED (*Tringa glareola*).

Hvidmose v. Holstebro: 4 par.
 Karup Hede: 1 par.
 Borris Hede: max. 6 par.
 Ellers ingensikre iagttagelser.
 Må som trækgæst siges at være mere alm. end svalekliren.
 Trækbiotoper de samme som svaleklire, optrædende som denne enkeltvis eller i småflokke.
 Flere ex. set i yngletiden i indsanderne ved Ulfborg. Måske ynglepar.
 Træktal pr. år vil foreligge senere.

RØDBEN (*Tringa totanus*).

Almindelig trækgæst, optrædende enkeltvis eller i småflokke ved alle åer, smådamme og søer. Ynglende ved Skjern Å.

SORTKLIRE (*Tringa erythropus*).

Mere ustadigt forekommende end de øvrige klirearter.

HVIDKLIRE (*Tringa nebularia*).

I sensommeren overalt i Vestjylland, enkeltvis eller i småflokke. Foruden de trækbiotoper, der er nævnt under svaleklire, kan den endvidere træffes ved kullejer, således 6 ex. i kulleje v. Abildå 4/8-71 (CH)

MUDDERKLIRE (*Tringa hypoleucos*).

Meget almindelig i sensommeren i Vestjylland. Flokstørrelsen sædvanligvis 5-10 ex. Endvidere påfaldende mange oversomrende ex. ved Omme Å, Karstoft Å, Skjern Å, Karup Å, og ikke mindst Rind Å. Vi formoder stærkt, at ynglen finder sted hvert år på disse lokaliteter. Men sikre beviser mangler, dog ikke fra Rind Å, hvor sidste sikre ynglebevis stammer fra 1952. Ynglefund fra samme lokalitet i begyndelsen af tresserne (NEF)
 For alle klirearternes vedkommende vil samlede træktal pr. år foreligge om ca. 2 år.

ALMINDELIG RYLE (*Calidris alpina*).

Knudmosen: 1 ex. 27/7-67, 1 ex. 7/8-67.
 Ret almindelig under efterårstrækket.

KRUMNÆBBET RYLE (*Calidris ferrugineus*).

Gødstrup Sø: 2 ex. ringmærket 25/7-65 (NEF)
 Ustadig of fåtallig på efterårstrækket.

BRUSHANE (*Philomachus pugnax*).

 Knudmosen: få i august og september, men ustadig og ikke årligt.
 Gødstrup Sø: 8 hun 9/5-71.
 Ret fåtalligt på efterårstrækket i Vestjylland.

KLYDE (*Recurvirostra avosetta*).

 Kragssøen: 1 ex. 1/5-1971.
 Usædvanlig iagttagelse og eneste indkomne.

THORSHANE (*Phalaropus fulicarius*).

 Birk Bæk, Gjellerup: 1 juv. han i vdr. 25/10-1916 (HM)

ODINSHANE (*Phalaropus lobatus*).

 Knudmosen: 1 ad. hun 28/8-1921 (HM)
 Eneste kendte fugl fra Vestjylland.

ALMINDELIG KJOVE (*Stercorarius parasiticus*).

 Skjern: 1 ex. 16/5-1922 (HPH)
 Holstebro: 2 ex. 10/8-1922 (HPH)

LILLE KJOVE (*Stercorarius longicaudus*).

 Tiphede pr. Mølby: 1 ex. 7/10-1918.

SVARTBAG (*Larus marinus*).

 Ustadig gæst bl.a. i Knudmosen, hvor den er set blandt
 juv. af sølvmåger.

SILDEMÅGE (*Larus fuscus*).

 Fouragerende fåtalligt, næsten kun juv.ex.
 Herning: 1 juv. han 15/8-1921
 Brande:: 1 ad hun. 2/10-1916.

SØLVMÅGE: (*Larus argentatus*).

 Alm. fouragerende. Navnlig juv. ex.
 Mistanke om ynglen i Søby lejerne.

STORMMÅGE (*Larus canus*)

 Alm. fouragerende i området både juv. og ad.

GRÅMÅGE (*Larus hyperboreus*)

 Ringkøbing: 1 ex. 18/12-1919 (HPH)

HÆTTEMÅGE (*Larus ridibundus*).

 Borris Hede: en koloni med 80 par.
 Knudmosen: 2 kolonier, med henholdsvis 70 og 10 par.
 Videbæk: 8 par.
 Kragssøen: ca. 100 par.
 Meget almindelig fouragerende i Vestjylland, fortrinsvis ad.ex.

RIDE (*Rissa tridactyla*)

 Hammerum: 1 ex. 15/8-1921 (HPH)
 Skarrild: 1 han 14/8-1921 (HPH)
 Gødstrup Sø: 1 juv. ex. 25/7-1965 (NEF)
 Iagttages fortrinsvis i indlandet efter stærk vestenvind.

SORTTERNE (*Chlidonias niger*).

 KARUP: 1 ex. rastende og fouragerende 18/5-71 Kl.1030 (MM)
 Gødstrup Sø: 2 juv. og 1 ad. 22/7-65.

ALK (*Alca torda*).

 Studsgaard: 1 ad. han i vdr. 20/1-1924 (HM)
 Herning: 1 ad. hun i vdr. 27/1-1924 (HM)

SØKONGE (*Plotus alle*)

 Gødstrup Sø: 29/5-1955 (HM) 1 ex. ad. i vdr.

LUNDE (*Fratercula arctica*).

 Sdr. Felding: 1 juv. hun i vdr. 19/12-1926 (HM)

TURTELDUE (*Streptopelia turtur*).

 Staby v. Ulfborg: 1 ad. hun 24/5-1917.
 Kronborg pr. Sinding: 1 juv. hun 4/10-1919.

SLØRUGLE (*Tyto alba*).

 Ingen iagttagelser indkommet. Sammenholdes dette med de få ex. fra Vestjylland HPH har konserveret fra 1908-37 fås et billede af artens østlige udbredelse, ligesom den synes at have været i stærk tilbagegang.

STOR HORNUGLE (*Bubo bubo*).

 Skjern: 1 ex. 24/11-1934 (HPH)

SPURVEUGLE (*Glaucidium passerinum*)

 En særdeles spændende forekomst af arten i 1960, hvor 1 ad. han blev skudt i Nøvling NV for Herning. Ex. befinder sig i Herning Museums fuglesamling.

KIRKEUGLE (*Athene noctua*)

 Borris: 1 par.
 Astrupnv. for Borris: 1 par,
 Lind: 1 par.
 Herning Trælsthhandel i Herning nordlige bydel: 1 par.
 Høgild: på gaard 1 par.

NATUGLE (*Strix aluco*).

Borris: 1 par.

Ses endvidere jævnligt mange steder navnlig i aftentimerne. Vi mangler imidlertid i udstrakt grad oplysninger om ynglepar. Indsend derfor alt om natugle. Vi modtager med Tak.

SKOVHORNUGLE (*Asio otus*).

Høgild-Birkebæk: må formodes at yngle her. Ingen ynglebeviser.
1 juv. hun. Birkebæk 2/7-1909.

MOSEHORNUGLE (*Asio flammeus*).

Herning Holm Å : 1 ex. Sommeren 1971 (KL)
Hvidmose v. Holstebro: 1 par.
Videbæk: 1 ynglepar (CH)
Solsøhede v. Videbæk: 2 ex. set 22/5-69.

PERLEUGLE (*Aegolius funereus*)

Nørremarken Viborg: 1 ex. 4/11-1921 (HPH)

NATRAVN (*Caprimulgus europaeus*).

Yngler i Høgild-Birkebæk komplekset. Læge Tage Plesner, Herning har angivet 10-20 ex.
Karup Hede: 10-15 par. Spinnende hanner hørt. i Kloksvig plantage i indsandene v. Ulfborg forsommeren 1968.
Ulfborg Aktieplantage: 1 han hørt 1968.
Hoverdal Plantage: 1 han hørt 1968 (JB).

MURSEJLER (*Apus apus*).

Må allerede ret tidligt have været ynglefugl i Herning. 2 ex. skudt 27/8-1921 over Knudmosen (HM) og angives at blive set "nu og da" (HPH). Ynglebestanden i dag i Herning er ca. 50 par. Ses endvidere over Holstebro, Borris, Ølgod, Skjern og andre større landsbyer og købstæder. Nøjagtige parangivelser mangler.

ISFUGL (*Alcedo atthis*).

En del fra 1908-37. Her skal blot nævnes: 1 ad. hun Rind, A: 20/8-1921 (HM). NEF angiver den som ynglefugl her sidst i halvtredserne. Er set her siden, dog ikke ynglefugle (NEF)
Hald Sø: 1 ynglepar 1966, 1 ex. 12/4-1970.
Karup Å: 1 ex. set ved kanal. i 1965.
Den milde vinter 1970-71 har sikkert favoriseret bestanden.

BIÆDER (*Merops apiaster*).

Gravl pr. Tarm: 1 han 16/5-1922 (HM)

ELLEKRAGE (*Coracias garrulus*).

Rind: 1 ad. hun 2/11-1932 (HM)

HÆRFUGL (*Upupa epops*).

"Rosenholm" v. Holstebro: 1 ex. 17/10-1918 (HPH)
 Yngler i Vestjylland (Hedegaard Christensen, DOFT 1971)

GRØNSPÆTTE (*Picus viridis*).

Egeris Skov v. Videbæk: 1 ex. 13/8-69 (CH) 2 ex. 5/10-71.
 alle strejfgæster.
 Dollerup: 1 par ynglede 1969-70 (OH)
 Høgild-Birkebæk: 10-15 par.
 Som hos isfuglen har den milde vinter 1970-71 uden tvivl
 haft gunstig indflydelse på bestanden.

VENDEHALS (*Jynx torquilla*).

Gulborgsand Plantage SV for Viborg: 1 par 1966.
 Høgild-Birkebæk: max. 3 par.
 Observationer af denne art er særligt velkomne.

TOPLÆRKE (*Galerida cristata*).

Ret almindelig i de større købstæder på industriarealer,
 rangerterræner:
 Herning: 10-20 par.
 Nøjagtige talangivelser af ynglepar er dog ønskelig fra alle
 egnede lokaliteter.
 Opsøg alle tørre kulturområder i forbindelse med bebyggelse.

HEDELÆRKE (*Lullula arborea*).

Støvbæk Skov sø for Holstebro: set.
 Harrild Hede: 2-3 par.
 Flyvestation Karup: set i 1969 og 1970.
 Høgild-Birkebæk plantager: få par (NEF) formentlig 3 par.
 Almindelig ved. Høgildgaard og Jyndevad.
 Knudmosen: ses undertiden, yngler ikke længere; 1 ex. 10/4-71.
 Kibæk: 1 ex. 25/12-1919 (HPH)
 Kølkjær: 1 ad. han 10/11-1922 (HM)

DIGESVALE (*Riparia riparia*)

Oplysninger ønskes om alle kolonier (beliggenhed og parantal)
 Hover: større koloni i grusgrav. Antal redehuller ikke talt.
 Koloni i grusgrav N for Nørre Klovsig plantage, 8-10 redehuller
 besat. Alle ved Ørnhøj (JB)

GULDPIROL (*Oriolus oriolus*)

Assing: 1 ad. han 14/6-1923 (HM)
 Tulstrup: 1 ad. hun 15/5-1973 (HM)
 Gødstrup: 1 syngende han 24-26/5. (Flora & Fauna årg. 71. s. 179)

SORTKRAGE (*Corvus corone corone*)

1 strejffende ex. på mark ø. for Videbæk 5/10-71 (CH)
 1 trækkende ex. mod s ved Søby Sø 25/10-70.
 1 ex. FASTERHOLT 21/3-1921 (HPH).

GRÅKRAGE (*Corvus corone cornix*).

 Oplysninger ønskes om alle større overnatningspladser.
 Antal, artssammensætning - Gråkrage, sortkrage, allike og råge.

RÅGE (*Corvus frugilegus*).

 Vildbjerg (store Romvig): Koloni ca. 50 par (NEF)
 Karup: flokke vinteren 69-70.
 Ses iøvrigt ustadigt i området.
 Vi opfordrer til at være opmærksom på arten.

NØDDEKRIGE (*Nucifraga caryocatactes*).

 Fra invasionsåret 1968: 1 ex. 1/9-69 Strå sø Plantage v. Ulfborg.
 1 ex. Hoverdal Plantage, ligeledes v. Ulfborg: 2 ex. iagttaget
 i august 1968 ved Karup.

HALEMEJSE (*Aegithalos caudatus*).

 Mindre flokke på 5-7 ex. obs. i Dollerup efteråret 1967)CH)
 Den bedste vestlige lokalitet for arten synes at være Knudmosen
 v. Herning. 1 par ynglede i 1963 i Birkebæk Plantage (NEF)

SPÆTMEJSE (*Sitta europaea*).

 Hald Sø: 10 ex. 3/2-1970.
 Arten synes østlig orienteret i udbredelse.

TRÆLØBER (*Certhia familiaris*).

 Set i park i Herning 1967.
 Vi har ingen oplysninger om den som ynglefugl i Vestjylland.
 Alle observationer - specielt med henblik ynglen -
 modtages med tak.

VANDSTÆR (*Cinclus cinclus*).

 Sædvanligvis en enkelt hver vinter ved fiskedammene i Karup,
 sidste obs. 69-70 (OH)
 Hald Sø: 1 ex. 1/3-1970.
 Karstoft Å: 1 ex. 2/4-1966.

MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*).

 Høgild-Birkebæk: max. 50 par.
 Talangivelser i Vestjyllands øvrige plantager efterlyses.
 Alm. trækgest i store flokke.

SJAGGER (*Turdus pilaris*).

 Vi efterlyser ynglefund - Send ind.

SANGDROSSEL (*Turdus philomelos*).

 Vi opfordrer til optælling af ynglepar i plantager
 specielt nåletrær.

RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*).

 Søby Sø: 3 ex. 18/4-71 (BB)
 Borris Hede: 1 han 17/4-71 (CH)
 Videbæk Mose: 1 han 27/4-71 (CH)

STENPIKKER (*Oenanthe oenanthe*).

 Videbæk: 3-4 ynglepar 1971 (CH)
 Flere par på flyvestation Karups område. Rede m. unger i 1968.
 Knudmosen: 1 hun 26/8-1967.

RØDSTJERT (*Phoenicurus phoenicurus*).

 Set i Indsandene ved Thorsted og Ulfborg.
 Videbæk: 1 ynglepar 1971 (CH)
 Kragssøen: 1 par ynglende 1971, rede fundet. Hun 1/4-70.
 Grusgrav v. Karup: 4 ex. 18/6-1919.
 Skærbæk, Rind plantage: 5 store udfløjne unger 22/6-70.

NATTERGAL (*Luscinia luscinia*).

 Knudmosen: 1 påfaldende observation, 1 syngende han i foråret
 og sommeren 1971.
 Gødstrup Sø: i 40erne.

GRÆSHOPPESANGER (*Locustella naevia*).

 Knudmosen: 1 ex. 1964 (Wium Andersen)
 Borris Hede: 1 han 16/5-71 (CH)

Vi mangler i udstrakt grad oplysninger om alle sangerne.
 Vi opfordrer derfor til ekskursioner i foråret til nominelle
 sangerlokaliteter i nat- og tidlige morgentimer.
 Talangivelser efterlyses.

RØDTOPPET FUGLEKONGE (*Regulus ignicapillus*).

 Skærbæk Plantage v. Herning: 1 syngende han 23/6-70.

GRÅ FLUESNAPPER (*Muscicapa striata*).

 Herning: 1 ad. han 26/5-1919 (HM)
 Høgild-Birkebæk: 2-3 par (NEF)
 Sdr. Anlæg Herning: 1 ex. 31/7-65.
 Ølgod: 1 ex. 20/7-1966.
 Borris: 1 ex. 30/6-67.
 Må betegnes som ynglefugl i vestjylland.

BROGET FLUESNAPPER (*Muscicapa hypoleuca*).

 Kidriis Plantage: 1 ad. han 10/5-57 (HM)
 Herning: 1 juv. han 14/8-1918 (HM)
 Yngler i Birkebæk plantage med ca. 15 par (NEF)
 Ølgod kommuneplantage: 1 hun 20/7-66.

JERNSPURV (*Prunella modularis*).

Alle yngle- og vinteriagttagelser spec. fra nåletræsplantagerne modtages med tak.

GUL VIPSTJERT (*Motacilla flava*).

Få par ved egnens åer og søer. En decideret optælling i undersøgelsesområdet mangler.

SILKEHALE (*Bombycilla garrulus*).

Talrige småflokke på Herning-egnen i invasionsåret 1965. En større flok på 300 ex. blev iagttaget i Mindeparken i Herning. Endvidere mindre flokke i 1966. Iøvrigt sporadisk og ustadig hver vinter.

TOR TORNSKADE (*Lanius excubitor*).

Knudmosen: 1 ad. han 28/10-1922 (HM)

Set her både forår og efterår - Trækgæster.

Borris Hede: 4 ex. 2/7-67 - sikkert ynglefugle.

Ulfborg: 1 ex. december 1966.

RØDRYGGET TORNSKADE (*Lanius collurio*).

Sdr. Anlæg Herning: 1 ad. han fundet død 6/5-54.

Fuglen findes på Herning Museum.

Ørnhøj brunkulsleje: 1 han 24/5-1969.

Grove Hede: 1 ynglepar sommeren 1971. Gamle fugle set (urolige m. føde i næbbet)

Er sjælden og ustadig som ynglefugl i Vestjylland.

KÆRNEBIDER (*Coccothraustes coccothraustes*).

Kølvrå: 2 ad. og 3 pull set i sommeren 1971.

Ellers ingen yngleiagttagelser eller obs. overhovedet fra Vestjylland.

STILLITS (*Carduelis carduelis*).

Ved Videbæk: 3-4 ynglepar.

Høgild-Birkebæk: ca. 10 par. 1 strejfgæst mellem vindrossler 9/10-65

Sdr. Resen v. Karup: Flok på 25 ex.

Karup Ådal: 2 ex. 21/5-71

Gødstrup Sø: 2 ex. 24/4-71.

GRØNISKEN (*Carduelis spinus*).

Høgildgaard Plantage: ynglede i 1964 NEF angiver 50-75 par.

Egeriis Skov: 2 ex. 13/4-71.

Kragsøen: flokke i begyndelsen af 1971.

Karup: 20 ex. 1/1-70, 8 ex. 26/12-70.

Sdr. Resen: 175 ex. 23/1-70, 100 ex. 3/4-70.

Hald Sø: 100 ex. 3/2-70.

GRÅISKEN (*Carduelis flammea*).

Ses næsten hver vinter.
 Porshøj, Herning: 10 ex. 14/11-65.

DOMPAP (*Pyrrhula pyrrhula*).

Dollerup: 1 par ynglede i 1969 og 1970 (OH)
 Kragssøen: 1 par i 1970 og 1971.
 Birkebæk Plantage: ynglede i 1963-64 (NEF), 1 han 3/8-68.
 Arten formodes at yngle ret talrigt i plantagerne.

KROGNÆB (*Pinicola enucleator*).

Tiphede v. Vildbjerg: 1 ad. 5/11-1921 (HM)

LILLE KORSNÆB (*Loxia curvirostra*).

Høgildgaard Plantage: ynglede med sikkerhed i 1964.
 synes at yngle hvert år i variende antal.
 5 ad. + 2 juv. 25/4-71, 4 ad. + 3 juv.
 15/5-1971.
 Hald Sø: 2 ad. og 2 pull. 21. og 22/4-70.
 Søby Sø: 5 ex. 18/4-71 (BB)
 Kidriis: 1 ad. han 10/2-1927 (HM)

STOR KORSNÆB (*Loxia pytyopsittacus*).

Rind Plantage: 2 ad. hun, 1 ad. han og 1 rede 14/2-23 (HM)
 Særdeles usædvanlig ynglefund.

SNESPURV (*Plectrophenax nivalis*).

Herning: 1 ex. 31/3-1960. ingen obs.

Litteraturliste:

-
- Andersen, Tage Holdgaard: Feltornithologen 1970-1:Knudmosen.
- Andersen, Tage Holdgaard & Herning Museums Fuglesamling
Donnerborg, Esben (Fortegnelse over fuglesamlingen
på Herning Museum)
- Bruun, Bertel 1960 : De ynglende Knopsvaners fordeling
mellem kysten og indlandet i Danmark
1935-1959: DOFT 54: 77-84.
- Bøgner, I, 1962 : Rugende sjagger.... ved Ringkøbing
1961 DOFT 56:84.
- Christiansen, Arthur 1935: Ynglende korsnæb i Herningegnes
plantager 29: 22-29
- Christiansen, J.D. 1890 Viborg Omegns Fugle.
- Donnerborg, Esben & 1971: Ornithologiske undersøgelser
Tage Holdgaard Andersen : i Vestjylland.
- Donnerborg Esben & 1971: Knudmosen.
- Tage Holdgaard Andersen :
- Dybro, Tommy : Fiskehejrens udbredelse i Danmark
1968. DOFT 64: 45-70.
- Ferdinand, L. 1971: Større Danske Fuglelokaliteter I
- Hansen, Kjeld 1970: Midtjydske Fuglelokaliteter I.
- Hedegaard Christensen, J.: 1958: Biædere ... ved Skjern Maj 1955
DOFT 52: 144-145.
- Hedegaard Christensen, J. : 1970: Ynglende hærflugl.. DOFT 64:270-71.
- JoensenAnders Holm : 1967: Urfugle i Danmark. Danske
Vildtundersøgelser Hæfte 14.
- Kjær, Thorvald : 1932: Hjejlen... som yngleflugt i
Jylland. Flora og Fauna 38:77-83.
- Møller, H.U.Skotte: 1970: Midtjyllands Fugle.
- Møller, H.U.Skotte & 1971: Årsrapport 1970
Hansen, Kjeld : Midtjylland.
- Overgaard, Chr. 1935: Herning-egnens Fugleliv.
Danske Fugle 4: 139-146.
- Poulsen, C.M., Fuglene i Vestjyllands Plantager
syd for Limfjorden. 41: 237-266.
- Poulsen, C.M., En undersøgelse over hedelærken i
Ringkøbing Amt. Flora og Fauna 69:1-8.
- Randløv, R.P., 1940: Høgesanger ynglende i
Vestjylland. 34:207.