




Forekomst af Musvåge ved Geddal enge. Maks. tal.

Musvåge:

Der er i alt set 40 musvåger. I 1992:18; 1993:5; 1994:6 og 1995:11. Bortset fra 1995, hvor der blev set lige mange musvåger i første halvår som i sidste halvår, ses de fleste fouragere i efterårsmånederne.


Der yngler 2 par musvåger lige nord for Sønder Lem Vig.


Fjeldvåge:

Der er i alt set 11 fjeldvåger. I 1995 kun 1. Alle fjeldvåger er set i oktober måned, bortset fra 2 - nemlig i 1992 d. 11/11 og i 1993 d. 30/1.

Fiskeørn:

Der er i alt set 7 fiskeørne. To i hvert af de tre første år og én i 1995. Alle fra midten af august til midten af september, bortset fra den ene i 1995, der allerede blev set d. 26/7. Den trak mod øst kl. 08.50. De fleste har været trækkende fugle, men nogle få har fisket efter fladfisk i Limfjorden lige uden for området.





Forekomst af Tårnfalk ved Geddal enge. Maks. tal.

Tårnfalk:

Der er i alt set 41 tårnfalke. I 1992:10; 1993:6; 1994:17 og 1995:8. Tårnfalkene fourager på engene som Musvåge og Blå Kærhøg også i vintermånederne, hvis engene da ikke er tilfrosede eller oversvømmede. Der ses flest i sensommeren, hvilket sikkert skyldes, at der yngler mindst to par omkring Sønder Lem Vig.

Dværgfalk:

Der er i alt set 3 dværgfalke. To i 1993. 1 d. 16/4 og 1 d. 29/9. Desuden 1 d. 15/4 1995. Den sad på en pæl, da den blev opdaget.

Lærkefalk:

Der er set 2 Lærkefalke - begge i 1995. Nemlig d. 10/9 kl. 14.15 og d. 23/9 kl. 15.06. Begge var der kun i meget kort tid, inden de trak syd.

Vandrefalk:

Der er kun én gang set Vandrefalk - nemlig den 1/10 1994, hvor den rastede på engene lige ud for P-pladsen mellem kl. 09.30 og 11.15. Den blev antaget til at være en juv. Den sad på en pæl, da den første gang blev opdaget. Senere var den i luften over de svømmende ænder, hvor den forsøgte sig uden held. Det sidste vi så var, at den fløj ned på engen i NØ-området. Den er kun set her denne ene dag.

Den 8/11 1994 blev der dog set én Vandrefalk komme flyvende over Sønder Lem Vig fra Geddal Enge videre mod nord (Per Grøn).

HØNSEFUGLE.

Agerhøne:

Ynglefugle:

Agerhønen yngler med et enkelt par. Måske dog lige uden for reservatgrænsen.

Rastefugle:

Det er meget få agerhøns der er set gennem årene. Således var der kun 3 obs. i 1992, hvor maks. var 9 d. 31/10. Derefter skal vi helt hen til 1995, før der igen observeres agerhøns, nemlig 7 d. 21/9.

Vagtel:

Ynglefugle:

Ingen. Men har sandsynligvis i 1994 ynglet i Sønder Lem Vig med 1 par.

Rastefugle:

Der er kun hørt en fugl i hele perioden, nemlig d. 8/5-94. Fuglen hørtes sydøst for engene, lige ud for den store P-plads.

Vandrikse:

Ynglefugle:

Yngler sandsynligvis med 1-2 par. Første gang den er hørt er d. 9/6-92. Derefter hører vi først fra arten igen i 1994, hvor den foråret/sommeren igennem høres med 1-2 individer. I 1995 høres den igen med 1-2 individer foråret/sommeren igennem. Det er så godt som altid i vestenden, vi hører denne fugl.

Rastefugle:

Det er kun de lokale ynglefugle, der ses i området.


Grønbenet Rørhøne:

Ynglefugle:

Siden 1994 har arten ynglet med 1 - 2 par. D. 20/8-95 sås 1 par med 4 juv. fugle

Rastefugle:

Det er kun de lokale ynglefugle, der ses i området. Maks. tallet for alle årene er 6 d. 20/8-95. Derudover er der kun set 1 til 2 fugle. Det er næsten kun i vestenden, vi har set denne art.



Forekomst af Blishøne ved Geddal enge. Maks. tal.

Blishøne:


Ynglefugle:

Har sandsynligvis ynglet med 15 - 20 par i alle år. Mange af kuldene går tabt p. gr. a. ræve, krager, måger samt oversvømmelser. Der er således kun i et år observeret mere end 4 par med pull.. Nemlig i 1995, hvor der sås 5 par med henholdsvis 1, 2, 2, 4 og 5 pull..

Rastefugle:


Bortset fra dec. og jan. kan arten ses året rundt. Som det ses af diagrammet topper antallet af blishøns i juni./juli. En væsentlig del af blishønsene er trækfugle, som flyver til Vesteuropas kystegne. Vi får så til gengæld en masse blishøns fra Sverige, Finland og Rusland, som forsøger at overvintre her.

Føden består foruden af småsnegle, mindre muslinger og vandinsekter, især af vandplanter som vandaks, tusindblad, vandpest og kransnålsalger. Går også af og til på land og græsser.




SUM OG MAKSTAL I PROCENT FOR VADEFUGLE 92-95.

Fordeling af vadefugle i perioden 92-95 på Geddal enge




Maks. tal for udvalgte vadefugle for alle årene.

Fordeling af vadefugle i perioden 92-95 på Geddal enge



Sum tal for udvalgte vadefugle for alle årene

VADEFUGLE.



Forekomst af Strandskade ved Geddal enge. Maks. tal.

Strandskade:

Ynglefugle:

Strandskaden har gennem alle årene ynglet med 1-2 par. Dog ikke sikkert ynglende i 1995. Den har derimod i flere år ynglet med et par på en mark et par km herfra.


Den kræver helt kortgræssede enge som redehabitat, så det er vigtigt, at engene afgræsses godt.


I 1995 blev der udover afgræsning foretaget høslæt.

Rastefugle:

Der ses strandskader på engene fra marts til og med begyndelsen af august. Den tidligste er set den 14/3 93. De fleste opholder sig ude på selve stranden mellem engene og fjorden. Maks. tallet for de fire år var 11 den 3/7 1994. Normalt ses eller høres fra 1-6 strandskader i juni - august. Herefter trækker de til vinterkvarteret i Vest- og Sydeuropa.

Strandskaden søger føde både på stranden og engene, hvor den med sit lange næb boret ned i bundlaget finder børsteorme, muslinger, krebsdyr og insekter.





Forekomst af Klyde ved Geddal enge. Maks. tal.

Klyde:

Ynglefugle:

Klyden har været fast ynglefugl på engene siden genoprettelsen i 1992 med min. 1-2 par årligt. I 1994 dog med 3-5 par. I 1995 opgav klyderne, da det blev så tørt, at ræven kunne gå over det hele. Havde bl.a. rede på tange lige ud for p-pladsen.

Rastefugle:

Klyderne ses i de fire måneder april-juli i et antal fra 2-17. Største antal 3/7 1994. Det er hovedsagelig ynglefuglene fra området. De tidligste 2 er set den 21/3 1995. Den 4/9 1993 blev der set 4 klyder. De fleste klyder samles til fjerfældning i Vadehavet inden borttrækket til Sydeuropa og Nordafrika.

Føden er især slikkrebs og børsteorme, men også insektlarver, bløddyr og fiskeæg.

Lille Præstekrave:


Ynglefugle:

Lille Præstekrave overraskede os i 1993 ved at spille syg på selve p-pladsen. Vi mener dog, at den yngede ved grusvejen tværs gennem reservatet tæt herved. Det samme gentog sig året efter, men vi er ikke sikker på, at den yngede i 1995. Da blev der set 3 den 30/5.

Rastefugle:

Der er ikke iagttaget andre fugle end ynglefuglene.

Den overvintrer i Afrika, og dens føde er insekter, edderkopper og andre smådyr..



Forekomst af Stor Præstekrave ved Geddal enge. Maks. tal.


Stor Præstekrave:


Ynglefugle:

Stor præstekrave er anslået til at yngle med 3-6 par gennem alle fire år. Således 3 juv. den 26/6 93 og 4 juv. den 11/7 93 samt 2 pull den 18/7 95. Reden har de nede på strandbredden.

Rastefugle:

Det største antal fugle er set den 22/8 95 - nemlig 42. Tallet er steget år for år. Således 10 i 1992; 28 i 1993 og 30 i 1994. Den tidligste er set den 21/3 95 og den seneste den 10/9 95. De fleste fugle ses i den vestligste del. Fuglene overvintrer i Vest- og Sydvesteuropa. Deres føde er i hovedsagen forskellige insekter og krebsdyr.





Forekomst af Hjejle ved Geddal enge. Maks. tal.

Hjejle:

Ynglefugle:

Ingen.

Rastefugle:

Geddal enge er en udmærket rasteplass for hjejlen. De største tal er set i april måned med små 2.000 hjejler. August og oktober måned oplever også mange hjejler. Se diagram. De sidste er set den 14/11 93, før de tager af sted til Sydvesteuropa og Middelhavsområdet. Bortset fra dec., jan. samt juni måned ses der hjejler på engene. De store flokke står på de vestligste enge og raster.

Hjejlen lever af diverse smådyr, oftest biller og regnorme.

Strandhjejle:


Ynglefugle:


Ingen.

Rastefugle:

Kun i året 1993 er der set strandhjejler. 10 i april, 1 i juli og 1 i august.

Strandhjejlen er en højarktisk art, der mest holder til ved kysten. De fleste overvintrer i Afrika.





Forekomst af Vibe ved Geddal enge. Maks. tal.

Vibe:

Ynglefugle:

Det anslås, at der findes 7-14 par. Da optællingen er sket fra diget langs reservatet, er der nogen usikkerhed om det nøjagtige antal. I 1993 blev tallet anslået til 7-10 par, men meget tyder på, at der er blevet lidt flere par med min. 14 ynglepar i 1995. Til sammenligning kan nævnes, at der i 1994 blev optalt ca. 50 par i Sønder Lem Vig.

Rastefugle:

Området har størst værdi som rasteområde. Efter yngletiden samles viberne både her og i Sønder Lem Vig i stort tal. Månederne med de største tal er juli, august og oktober. Max.-tallene er 1992: 228, 1993: 900, 1994: 1000 og 1995: 1220. Der kommer altså flere og flere viber for hvert år. Bortset fra januar måned kan der ses viber hele året. I de milde vintre har der hele året været viber i Sønder Lem vig. Føden består af insekter og orme mv.


Islandsk Ryle:

Ynglefugle:

Ingen. Den er en højarktisk fugl, der ikke ruger i Skandinavien.

Rastefugle:

I månederne juli og august er der i 1993 set 13, 1994 set 3 og i 1995 set 2. Den lever mest af smådyr i tidevandszonen, mest snegle og muslinger.



Forekomst af Dværgryle ved Geddal enge. Maks. tal.

Dværgryle:

Ynglefugle:

Ingen. Dværgrylen er en højnordisk art.

Rastefugle:

Dværgrylen ses især i august og september. Den ses på de mudrede flader sammen med alm. ryle.

1995 var et godt år med dag-maks. på 30. 1994: maks. 10 og 1993: maks. 8. Ingen i 1992. I 1995 blev der på forårstrækket set 2 den 7/5 og 4 den 20/5. Alle i sommerdragt, som de første på returtrækket tilbage til Afrika. Det er oftest i vestenden denne art opholder sig. Den lever af diverse smådyr.

Temmincksryle:


Ynglefugle:

Ingen. Den yngler i de skandinaviske fjeldegne fra den øverste del af nåleskovszonen og op i lavzonen.

Rastefugle:

Temmincksrylen er kun set i 1995 - nemlig 1 i maj og 1 i august. De er begge set i østenden af området.

Vinterkvartererne ligger i Afrika. Den lever helt overvejende af diverse smådyr.



Forekomst af Krumnæbbet Ryle. Maks. tal.


Krumnæbbet ryle:


Ynglefugle:

Ingen. Krumnæbbet ryle yngler på tundraen langs Ishavet i det nordlige Sibirien fra Jenisej-området og østover.

Rastefugle:

Krumnæbbet ryle er set alle årene med dag-maks. mellem 1 og 10. Bedst i 1995, hvor der på forårstrækket blev set 1 han den 1/5 og 2 ad. i sommerdragt den 19/5. Arten opholder sig for det meste på den vestlige ende af området. På returtrækket til vinterkvarteret i Vestafrika er den kun blevet set i juli og august. De først ankomne i sommerdragt. Den lever af diverse smådyr, som tages nær bredden eller på lavt vand.





Forekomst af Almindelig Ryle ved Geddal enge. Maks. tal.

Almindelig Ryle:

Ynglefugle:

Der er ikke med sikkerhed registreret nogen ynglende ryler, men muligheden for 1-2 par er til stede.

D. 31/5 1992 er der set 2 fugle, d. 2/6 1993 1, d. 11/6 1994 1 og d. 2/6 1995 8.

I atlasperioden er den fundet ynglende ved Handbjerg strand ikke så langt herfra.


Rastefugle:


De fleste ryler ses på forårstrækket i april måned, hvor der er set flokke på 300-600 i den vestlige del af området. Igen ses der mange ryler, når efterårstrækket sætter ind med de gamle fugle i august og ungfuglene i oktober. F.eks. 300-500 ryler d. 24.-25/8 1993 og 170 ryler d. 16/10 1994.

Rylen kan træffes her så godt som hele året, dog er den ikke set i december måned.

Rylens vinterkvarterer ligger hovedsagelig i Vesteuropa, Middelhavsområdet og Vestafrika.

Føden udgør mest smådyr (især slikkrebs), som enten samles på overfladen eller under boring med næbbet i 1-2 centimeters dybde.





Forekomst af Brushøns ved Geddal enge. Maks. tal.

Brushøns:


Ynglefugle:


Der er ikke med sikkerhed registreret ynglende brushøns. Der er ikke set faste dansepladser, men kun dansende brushaner forskellige steder. Den 25/4 1993 sås 3 hanner og 4 hunner, den 29/4 1994 114 (heraf min. 35-40 hanner, der dansede), og d. 20/6 1995 4 hanner + 1 hun. Brushanen har tidligere ynglet med 1-2 par ved Sønder Lem Vig.

Rastefugle:

Det største antal ses på forårstrækket i maj (157 d. 14/5 94), samt på efterårstrækket i juli af gamle fugle og i august af ungfuglene. F.eks. 100 d. 25/8 1993 og 126 d. 24/7 1994. I 1995 blev der ikke set så mange brushøns som i de forrige år. De tidligste er set den 20/4 1994 og den sidste den 11/10 1995. Brushønsene overvintrer fortrinsvis i Middelhavsområdet og Afrika.

De lever af diverse smådyr, samt uden for yngeltiden også af planteføde, især frø.





Forekomst af Dobbeltbekkasin ved Geddal enge. Maks. tal.

Dobbeltbekkasin:

Ynglefugle:

Det anslås, at der yngler fra 3-6 par på grundlag af spillende hanner i maj-juni. Således hørtes 6 spille d. 19/6 1993. Der er ikke fundet reder eller ungfugle. I 1994 ynglede der 9 par ved Sønder Lem Vig (Per Grøn).

Rastefugle:

Som diagrammet antyder ses langt de fleste af bekkasinerne i august og oktober, hvilket kunne tyde på forskellig træktid for unge og gamle fugle, som hos de andre vadefugle. Dette skulle dog ikke være tilfældet efter *Hans Meltofte: Vadefugle på Tipperne 1928-82*

s. 33. "Dobbeltbekkasinerne efterårstræk adskiller sig en del fra de fleste andre vadefuglearter. Først og fremmest er der ikke større forskel på adulte og juvenile fugles træktid. Begge aldersgrupper indleder omkring første halvdel af august med et træk fra ynglepladserne til fældningsområderne i Nordvesteuropa. Efter at have påbegyndt fældningen på ynglepladserne fuldfører de voksne fugle en totalfældning i august-september og ungfuglene en krops- og halefjersfældning hovedsageligt i perioden august - november.

Bekkasinerne opholder sig indenfor et begrænset område under fældningsperioden, hvorefter trækket fortsætter direkte til vinterkvarterene i Vesteuropa." Hvorfor der så her ved Geddal findes disse to toppe vides ikke. Er det mon trækfugle fra to forskellige yngleområder? D.

25/8 1993 200 og d. 31/10 221. D. 3/8 1994 191 og d. 15/10 152. D. 22/8 1995 490 og d. 15/10 73.

Bekkasinen lever fortrinsvis af regnorme og insekter, som den finder ved at bore sit lange, følsomme næb ned i fugtig eller våd bund.

Stor Kobbersneppe:

Ynglefugle:

Ingen. 75% af den danske ynglepoptation findes i Tøndermarsken, Tipperne, Vejlerne og Harboøre Tange.

Rastefugle:

Der ses kun få Kobbersnepper her. Ialt kun 17 i de fire år tilsammen. Det drejer sig om 6 i april måned, 5 i juli og 6 i september. Det bedste år var 1993 med ialt 11. Den er en udpræget trækfugl med vinterkvarter i indlandsområder i Vestafrika. Den lever fortrinsvis af regnorme, insektlarver, børsteorme og krebsdyr.

Lille Kobbersneppe:

Ynglefugle:

Ingen. Den yngler i det allernordligste Skandinavien.

Rastefugle:

Lille Kobbersneppe er kun registreret én gang på Geddal, nemlig den 26/3 1995 i vinterdragt. Den er en trækfugl med vinterkvarter i Vesteuropas og Vestafrikas kystområder. Enkelte kan overvinde, ligesom enkelte ikke-ynglende kan oversomme i Danmark. Den lever i hovedsagen af insekter, snegle, krebsdyr og ledorme.

Lille Regnspeve:

Ynglefugle:

Ingen. Yngler i store dele af Norge, Sverige og Finland.


Rastefugle:


Lille Regnspeve er iagttaget med ialt 10 fugle. 1993: 6; 1994: 2; 1995: 2.

Den overvintrer hovedsagelig i Afrika syd for Sahara.

Den lever i indlandet af insekter og bær. På mudderbanker tager den mest orme og krabber.

Den borer kun sjældent sit lange næb ned i jorden.





Forekomst af Stor Regnspove ved Geddal enge. Maks. tal.

Stor Regnspove:

Ynglefugle:

Ingen. Den yngler fortrinsvis i den vestlige del af Jylland samt i Norge og Sverige..


Rastefugle:

De fleste ses på efterårstrækket i juni, juli, august og september måneder. Der er ialt set 274 tilsammen i de fire år. De tidligste er set 14/3 1993 med 12 fugle. De seneste d. 17/11 1995 med 3.

Efterårstrækket starter allerede så tidligt som medio juni med de gamle, store hunner. En måned senere kulminerer de gamle hanner og sidst ungfuglene med kulmination medio august. Vinterkvarteret er hovedsagelig Vest- og Sydeuropa.

Den lever mest af insekter, regnorme, larver, snegle, krebsdyr og bær. Den kan på blød bund bore sit lange næb ned i en dybde af op til 12 cm.





Forekomst af Sortklire ved Geddal enge. Maks. tal.

Sortklire:

Ynglefugle:

Ingen. Sortkliren yngler i det nordligste Skandinavien i åben nåleskov.


Rastefugle:


Sortkliren er en fåtallig rastefugl.

Kun i 1995 er der set en enkelt på forårstrækket ellers er det månederne juni - september der er set op til 17 sortklirer. I juni ses de gamle hunner allerede efter kun 4-5 uger på ynglepladsen, d. 17/6 95 17 fugle. Fra medio juli ses de gamle hanner, d. 11/7 2. og fra august også ungfugle, d. 2/9 92 8.

Overvintrer i Middelhavsområdet og Afrika.

Den lever mest af forskellige insekter.





Forekomst af Rødben ved Geddal enge. Maks. tal.

Rødben:

Ynglefugle:

Det anslås, at der yngler 3-5 par Rødben. Således fandtes d. 22/5 1993 tre reder med æg ved optællingen af engene. Reden anlægges gerne i høj tæt græs. De øvrige år er tallet anslået efter varslende rødben. De findes over hele området. D. 4/7 1994 sås 22 Rødben, heraf 3 juv. og d. 24/7 1994 sås 6, heraf 2 juv. Rødben er en ret almindelig ynglefugl her i landet med en bestand anslået til 2000-4000 par.

Rastefugle:

De første rødben ses normalt i begyndelsen af april (d. 3/4 1994 9 stk.), og de fleste Rødben ses i månederne april-august. Det største antal er set d. 29/8 1992 med 40 stk. Juli måned har det største sum-tal med 247 rødben. Vinterkvarteret er Vesteuropa, Middelhavsområdet og Afrika. Føden er hovedsagelig krebsdyr, dyndsnegle og ledorme.

Damklire:


Ynglefugle:

Ingen. Nærmeste konstante ynglepladser ligger i Hviderusland.

Rastefugle:

Den 3/6 1995 kl. 15 opdagede dette hæftes forfattere en mistænksom klire fra diget mellem Sønder Lem Vig og Geddal Enge. Den lignede en lille Hvidklire, men den bevægede sig anderledes. Det viste sig at være en Damklire, som senere er blevet godkendt af SU. Damkliren er en meget sjælden gæst. Der var kun gjort 18 fund af 19 fugle til og med 1990 i følge Klaus Malling Olsen, 1992.

Den overvintrer hovedsagelig i Indien og i Afrika syd for Sahara.



Forekomst af Hvidklire ved Geddal enge. Maks. tal.

Hvidklire:


Ynglefugle:


Ingen. Yngler i Skandinavien og Rusland.

Rastefugle:

Der ses Hvidklire fra april-september. Langt de fleste ses i juli og august. Efterårstrækket indledes af de gamle hunner, som kan ses fra ultimo juni. (f.eks. 28/6 1993: 8). Generelt set kulminerer trækket af gamle fugle i juli, mens ungfuglene hovedsagelig passerer i august. Den seneste er d. 29/9 1993.

Hvidkliren overvintrer i det sydlige Europa og Afrika. Den lever fortrinsvis af ringorme, små krebsdyr og insekter.





Forekomst af Svaleklire ved Geddal enge. Maks. tal.


Svaleklire:


Ynglefugle:

Ingen. Den er en sjælden ynglefugl i de østlige egne af Danmark (40-50 par). Almindelig ynglefugl i Norge og Sverige.

Rastefugle:

De fleste Svaleklirer ses i juli og august. Det største antal er set d. 15/8 1993 med 12 stk. Kun én gang er de set på forårstrækket, nemlig d. 6/5 1994. De fleste ses fra diget i østsiden ved landevejen. Den sidste blev i 1994 set d. 4/9 og i 1995 d. 7/9. 1995 var det dårligste år . Svalekliren overvintrer i Middelhavsområdet og Afrika. Ganske få overvintrer her i landet. Svalekliren lever af diverse insekter, edderkopper og snegle.





Forekomst af Tinksmed ved Geddal enge. Maks. tal.

Tinksmed:

Ynglefugle:


Ingen. Tinksmeden er en sjælden ynglefugl i Danmark (100 par sidst i 1980'erne). Almindelig ynglefugl i Norge og Sverige.


Rastefugle:

De fleste Tinksmede ses i juli og august. Det største antal er dog set d. 10/5 1995 på forårstrækket. Den tidligste er set d. 5/5 1995. De fleste fugle er set fra diget ved landevejen på østsiden af området.

Langt hovedparten af Tinksmedene er set i de to sidste år. Tinksmeden ses oftere i september end Svalekliren. Den sidste er set d. 14/9 1994. Tinksmeden overvintrer i Afrika.

Tinksmeden lever af diverse smådyr, først og fremmest insekter.





Forekomst af Mudderklire ved Geddal enge. Maks. tal.

Mudderklire:

Ynglefugle:

Ingen. Meget sjælden ynglefugl i Danmark. Fra 1900-1990 ca. 10 ynglefund. Almindelig ynglefugl i Norge og Sverige.

Rastefugle:

Der ses kun halvt så mange Mudderklirer som Tinksmæde og Svaleklirer. De ses fra maj til september. De første ses om foråret d. 7/5 1995: 3 stk. Ultimo maj /beg. juni passerer de sidste på vej nord- og østover (f.eks. 1995: d. 20/5 1, 30/5 1 og 2/6 1). Der blev slet ingen set i 1993!

Efterårstrækket mod vinterkvartererne i Sydeuropa og Afrika indledes af de gamle fugle primo juli (d. 10/7 1995: 1). Den sidste er set d. 10/9 1995.

Mudderkliren lever hovedsagelig af insekter.

Odinshane:

Ynglefugle:

Ingen. Yngler i Nordskandinavien.


Rastefugle:

Odinshanen er set i alle fire år med én enkelt fugl. Enten i juni eller august måned. På landsplan er den også en sjælden trækgæst med 40-80 indrapporteringer årligt. Efterårstrækket ses tidligt på Geddal Enge (i 1995 allerede d. 17/6 og i 1993 d. 19/6), hvor hunnen i sommerdragt ses. Når den kan være her så tidligt, skyldes det, at det er hannen, der udruger æggene og passer ungerne. I 1994 sås en han i vinterdragt d. 19/8 og i 1992 sås en juv. i dagene omkring d. 29-30/8.

Odinshanen overvintrer på åbent hav i den nordlige del af Indiske Ocean. Flest ud for den Arabiske Halvø og i den Persiske Golf.

Den lever i yngletiden især af dansemyg, som den tager, mens den svømmer. Under fouragering svømmer den ofte lig en rørhøne på vandet og samler fødemner op med lynhurtige bevægelser. Ind imellem roterer den om sin egen akse for at hvirvle fødemner op.

MÅGER OG TERNER.



Forekomst af Hættemåge ved Geddal enge. Maks. tal.

Hættemåge:

Ynglefugle:

Ynglede i 1993 med ca. 100 par. Ved en totaltælling den 22/5 taltes 96 reder. I 1994 blev yngleforsøget hurtigt opgivet, hvilket også nogle få par gjorde i 1995. Grunden hertil er sikkert, at hele området er så lavvandet, at rævene nemt kan gå rundt over det hele. Siden 1993 ses rævene gå på engene selv om dagen. De bor i skrænten ned til engene.

Rastefugle:

Året igennem ses hættemåger raste her. Der er talt op til 800. Således d. 24/4 1993 og d. 18/8 1995. De fleste hættemåger holder til ved den nærliggende Handbjerg Strand.

Stormmåge:

Der ses gennemgående kun få stormmåger her. Mellem 10 -20. De største antal er 350 d. 3/4 1994 samt 250 d. 4/11 1995.

Sølvmåge:

Der ses året rundt meget få sølvmåger - mellem 2-10, mest gamle fugle. Den største obs. er 225 d. 3/4 1994.

Svartbag:

Svartbagen er en fåtallig rastefugl med kun få individer året igennem.

Splitterne:

Der er kun set splitterne i 1993, nemlig 4 d. 4/9 og 2 d. 27/7.

Fjordterne:


Der ses fjordterne fra maj til september, men kun i mindre antal. Den største obs. er 10 d. 19/5 1993.

Sortterne:

Den er kun observeret én gang, nemlig d. 19/5 1993.

SMÅFUGLE.

Det er især småfuglene på engene, der er talt op, men dog ikke ved alle tællinger. Småfuglene på skrænten er kun delvis talt op, så sum tallene ville være større i virkeligheden for de fleste småfuglearter, der ses i bilagene.



Forekomst af Sanglærker ved Geddal enge. Maks. tal.

Sanglærke:

Sanglærken er en almindelig ynglefugl på engene. Den ses fra januar til og med november. Det største antal der er observeret er 35.

Digesvale:


Et lille antal digesvaler yngler lige uden for reservatgrænsen i skrænten ned mod Limfjorden. Disse ses jage over engene i varierende antal. Største obs. er 85 d. 17/8 1992.

Landsvale:

I sensommeren ses mange landsvaler fouragere over engene. Den største obs. er på 350 d. 4/9 1994.

Bysvale:

Kun få bysvaler ses jage over engene. Største obs. 10 d. 30/8 1992.




Forekomst af Engpiber ved Geddal enge. Maks. tal.

Engpiber:

Den er en alm. ynglefugl på engene.

Det anslås, at der yngler ca. 10 par. Den største obs. er 35 d. 30/4 1995.



Forekomst af Gul Vipstjert ved Geddal enge. Maks. tal.

Gul Vipstjert:

Yngler hvert år med 1-2 par på engene. Ses fra maj til og med august.

Hvid Vipstjert:

Det vides ikke med sikkerhed, om den yngler på selve området, men fra april til september ses mellem 2- 11 fugle.

Bynkefugl:

Der er kun registreret bynkefugl i 1992 d. 9/8 med 2 stk.

Der yngede 11 par ved Sønder Lem Vig i 1994. (Per Grøn).

Stenpikker:

Der er kun registreret stenpikker den 27/4 1994 med 1 stk.

Sivsanger:

Der har ynglet sivsanger i 1992 og 1994 med et enkelt par.
Antallet er opgjort efter syngende hanner.

Kærsanger:

Der er kun 3 obs. af kærsanger. To fra 1944 (11/5 + 28/6) og én fra 1995: d.4/6.
Ved Sønder Lem Vig ynglede i 1994 5 par(Per Grøn).

Rørsanger:

Det anslås, at der her yngler 3-4 par, mens der er talt ca. 230 syngende hanner ved Sønder Lem Vig i 1994. (Per Grøn).

Skægmejse:

Der er d. 12/10 1992 set 6 skægmejser og 9/11 set 1. Alle på trækk.

Stær:

I sensommeren træffes mange stære på engen. D. 31/8 1994 1000 stk. og d. 22/8 1995 1500 stk.

Bjergirisk:

Den 15/10 1995 sås 9 på efterårstræk.

Karmindompap:

Den 28/6 1994 hørtes en syngende han.


Rørspurv:

Det anslås, at der yngler 2-4 par.



Referencer:

1. Fuglelivet i Sønder Lem Vig 1994. Ringkøbing Amtskommune, Landskabsafdelingen, Maj 1995. (Undersøgelse: Per Grøn).
2. Fuglene i Danmark, redaktion: Hans Meltofte og Jon Fjeldså, 1989.
3. Fugle ved Sønder Lem Vig '79, Jan Bolding, 1980.
4. Nordens Fugle. Benny Génsbøl, 1987.
5. Vadefugle på Tipperne 1928-82, Hans Meltofte, DOFT, 1987
6. Private optegnelser. Gerner Majlandt.



BILAG.

Bilag 1.

Art	Sum	Maks	Art	Sum	Maks.	Art	Sum	Maks
Lille Lappedykker	94	11	Blishøne	2137	135	Bynkefugl	3	2
Toppet Lappedykker	34	4	Strandskade	157	11	Stenpikker	1	1
Skarv	156	50	Klyde	345	17	Solsort	2	2
Rørdrum	8	1	Lille Præstekrave	3	2	Sjagger	3	3
Silkehejre	1	1	Stor Præstekrave	456	42	Misteldrossel	5	4
Fiskehejre	650	60	Hjejle	18331	1900	Sivsanger	2	1
Knopsvane	1318	65	Strandhjejle	14	10	Kærsanger	2	1
Pibesvane	58	24	Vibe	15926	1000	Rørsanger	8	2
Sangsvane	1043	221	Islandsk Ryle	18	6	Gulbug	9	3
Kortnæbbet Gås	1	1	Dværgryle	86	30	Gærdesanger	5	1
Grågås	1195	59	Temmincksryle	1	1	Tornsanger	4	1
Canadagås	50	25	Krumnæbbet Ryle	59	10	Havesanger	2	1
Bramgås	255	195	Almindelig Ryle	5304	600	Gransanger	4	2
Mørkbuget Knortegås	2	1	Brushøns	3038	157	Løvsanger	12	3
Lysbuget Knortegås	4	3	Dobbeltbekkasin	3423	490	Skægmejse	7	6
Rustand	2	2	Lille Kobbersneppe	2	2	Topmejse	2	1
Gravand	2053	100	Stor Kobbersneppe	16	6	Blåmejse	2	1
Pibeand	32791	3000	Lille Regnspove	9	4	Musvit	2	2
Amerikansk Pibeand	1	1	Stor Regnspove	254	43	Husskade	1	1
Knarand	57	6	Sortklire	129	17	Skovskade	1	1
Krikand	38765	3700	Rødben	983	40	Gråkrage	7	3
Gråand	26537	1500	Damklire	1	1	Stær	7167	1500
Spidsand	703	89	Hvidklire	672	34	Grønirisk	1	1
Atlingand	47	6	Svaleklire	99	12	Stillits	6	2
Skeand	269	19	Tinksmed	111	12	Tornirisk	328	150
Taffeland	179	33	Mudderklire	41	4	Bjergirisk	9	9
Troldand	243	31	Odinshane	6	1	Gråsiken	1	1
Bjergand	213	97	Hættemåge	5441	800	Karmindomp	1	1
Havlit	1	1	Stormmåge	377	350	Dompap	4	4
Hvinand	564	83	Sølvmåge	280	225	Gulspurv	6	2
Lille Skallesluger	24	3	Svartbag	5	4	Rørspurv	11	4
Toppet Skallesluger	114	9	Splitterne	6	4	Kornværting	1	1
Stor Skallesluger	20	14	Fjordterne	23	10	Råge	3	2
Havørn	1	1	Sortterne	1	1			
Rørhøg	80	4	Ringdue	4	3			
Blå Kærhøg	44	3	Gøg	3	2			
Duehøg	6	1	Mursejler	16	8			
Spurvehøg	20	2	Grønspætte	1	1			
Musvåge	32	3	Stor Flagspætte	4	1			
Fjeldvåge	11	3	Sanglærke	150	35			
Fiskeørn	6	1	Digesvale	220	85			
Tårnfalk	36	3	Landsvale	1071	350			
Dværgfalk	3	1	Bysvale	23	10			
Lærkefalk	1	1	Engpiber	62	20			
Vandrefalk	1	1	Gul Vipstjert	41	5			
Agerhøne	12	9	Hvid Vipstjert	88	11			
Vagtel	1	1	Gærdesmutte	3	2			
Vandrikse	7	2	Jernspurv	7	1			
Grønbenet Rørhøne	17	6	Rødhals	2	1			

Sum tal for alle år + den største enkelt obs i alle år

Bilag 2

Artsnavn	Maks. tal 92-95	1992	1993	1994	1995
Lille Lappedykker	11	4	3	8	11
Toppet Lappedykker	6			3	6
Skarv	50	4		50	17
Rørdrum	1		1	1	1
Silkehejre	1			1	
Fiskehejre	60	20	60	32	36
Knopsvane	65	7	64	65	48
Pibesvane	24		2	4	24
Sangsvane	221	9	221	147	17
Kortnæbbet Gås	1				1
Grågås	67	8	12	34	67
Canadagås	25		25	2	1
Bramgås	195		195	1	32
Mørkbuget Knortegås	1		1	1	
Lysbuget Knortegås	3		3	1	
Rustand	2			2	
Gravand	100	50	100	89	77
Pibeand	3000	200	3000	3000	3000
Amerikansk Pibeand	1				1
Knarand	7	2	6	3	7
Krikand	3700	600	1150	1680	3700
Gråand	1500	600	1200	1500	1000
Spidsand	89	30	34	62	89
Atlingand	6	3	6	2	3
Skeand	19	15	13	19	12
Taffeland	33	5	33	30	11
Troldand	31	8	20	31	30
Bjergand	97	2	97	5	
Havlit	1			1	
Hvinand	83	10	83	72	50
Lille Skallesluger	3		3	3	1
Toppet Skallesluger	12		9	6	12
Stor Skallesluger	14		1	14	13
Havørn	1			1	
Rørhøg	4	3	4	3	2
Blå Kærhøg	3	3	3	2	2
Duehøg	1		1	1	1
Spurvehøg	2	2	1	1	1
Musvåge	3	3	1	1	2
Fjeldvåge	3	1	3	1	1
Fiskeørn	1	1	1	1	1
Tårnfalk	3	3	2	2	2
Dværgfalk	1		1		1
Lærkefalk	1				1
Vandrefalk	1			1	
Agerhone	9	9			7
Vagtel	1			1	
Vandrikse	2	1		2	2
Grønbenet Rørhone	6			2	6
Blishone	135	100	135	100	70
Strandskade	11	6	7	11	6
Klyde	17	10	10	17	13

Lille Præstekrave	3		2	1	3
Stor Præstekrave	42	10	28	30	42
Hjejle	1900	120	1200	1900	1350
Strandhjejle	10		10		
Vibe	1220	228	900	1000	1220
Islandsk Ryle	6		6	3	2
Dværgryle	30		8	10	30
Temmincksryle	1				1
Krumnæbbet Ryle	10	1	8	8	10
Almindelig Ryle	600	6	500	400	600
Brushøns	157	40	100	157	92
Dobbeltbekkasin	490	34	221	191	490
Stor Kobbersneppe	6		6	2	1
Lille Kobbersneppe	2				2
Lille Regnspove	4		4	2	1
Stor Regnspove	43	24	43	35	15
Sortklire	17	8	4	6	17
Rødben	40	40	39	22	21
Damklire	1				1
Hvidklire	40	9	32	26	40
Svaleklire	12	8	12	8	3
Tinksmed	12	5	3	7	12
Mudderklire	6	3		4	6
Odinshane	1	1	1	1	1
Hættemåge	800	100	800	260	800
Stormmåge	350	2		350	250
Sølvmåge	225		3	225	40
Svartbag	4			4	1
Splitterne	4		4		
Fjordterne	10		10	2	1
Sortterne	1		1		
Ringdue	3	3	1		
Gøg	2	1			2
Mursejler	8	4		3	8
Grønspætte	1		1		
Stor Flagspætte	1		1	1	
Sanglærke	35	35	30	10	8
Digesvale	85	85		3	3
Landsvale	350	200	1	350	100
Bysvale	10	10		2	1
Engpiber	35	2	20	2	35
Gul Vipstjert	5	3	4	5	2
Hvid Vipstjert	11	4		11	6
Gærdesmutte	2			1	2
Jernspurv	1		1	1	1
Rødhals	1			1	
Bynkefugl	2	2			
Stenpikker	1			1	
Solsort	2		2		2
Sjagger	3		3		
Misteldrossel	4		1	4	
Sivsanger	1	1			1
Kærsanger	1			1	1
Rørsanger	10	1	1	2	10
Gulbug	3		2	1	3

Gærdesanger	1	1	1	1	1
Tornsanger	1	1	1		1
Havesanger	1		1		1
Gransanger	2			1	2
Løvsanger	3		2	2	3
Skægmejse	6	6	1		
Topmejse	1			1	
Blåmejse	2			1	2
Musvit	2				2
Skovskade	1		1		
Husskade	1				1
Råge	2		2	1	
Gråkrage	15	12		3	15
Stær	1500	465	200	1000	1500
Grønirisk	1				1
Stillits	2			2	
Tornirisk	150	150	1	100	
Bjergirisk	9				9
Gråsiken	1				1
Karmincompap	1			1	
Dompap	4				4
Gulspurv	2	2	1	1	2
Rørspurv	4	2		4	4
Kornværting	1				1

Kolonne 2 viser maks. tallene for alle fire år

Bilag 3.


Artsnavn	Sum 92-95	1992	1993	1994	1995
Lille Lappedykker	116	20	5	43	48
Toppet Lappedykker	43			20	23
Skarv	170	4		130	36
Rørdrum	11		2	1	8
Silkehejre	3			3	
Fiskehejre	828	46	188	223	371
Knopsvane	1540	23	465	589	463
Pibesvane	80		2	4	74
Sangsvane	1081	9	591	443	38
Kortnæbbet Gås	1				1
Grågås	1600	44	96	458	1002
Canadagås	50		47	2	1
Bramgås	274		199	3	72
Mørkbuget Knortegås	2		1	1	
Lysbuget Knortegås	4		3	1	
Rustand	5			5	
Gravand	2432	413	563	693	763
Pibeand	40832	1050	14748	10479	14555
Amerikansk Pibeand	6				6
Knarand	76	3	23	7	43
Krikand	51515	3654	3718	16387	27756
Gråand	34236	3391	8301	12581	9563
Spidsand	939	73	148	255	463
Atlingand	49	10	22	8	9
Skeand	303	78	49	70	106
Taffeland	204	9	86	82	27
Troldand	273	27	65	101	80

Bjergand	213	5	199	9	
Havlit	1			1	
Hvinand	839	15	134	332	358
Lille Skallesluger	34		6	16	12
Toppet Skallesluger	137		66	14	57
Stor Skallesluger	47		1	15	31
Havørn	1			1	
Rørhøg	90	18	17	31	24
Blå Kærhøg	57	12	13	10	22
Duehøg	8		1	2	5
Spurvehøg	23	9	3	8	3
Musvåge	40	18	5	6	11
Fjeldvåge	11	4	4	2	1
Fiskeørn	7	2	2	2	1
Tårnfalk	41	10	6	17	8
Dværgfalk	3		2		1
Lærkefalk	2				2
Vandrefalk	1			1	
Agerhøne	19	12			7
Vagtel	1			1	
Vandrikse	9	1		5	3
Grønbenet Rørhøne	20			8	12
Blishøne	2439	292	851	703	593
Strandskade	167	39	58	25	45
Klyde	382	55	71	160	96
Lille Præstekrave	6		2	1	3
Stor Præstekrave	504	39	108	147	210
Hjejle	18799	220	8296	6198	4085
Strandhjejle	14		14		
Vibe	18570	1053	4548	7495	5474
Islandsk Ryle	18		13	3	2
Dværgryle	115		19	30	66
Temmincksryle	2				2
Krumnæbbet Ryle	64	1	17	24	22
Almindelig Ryle	6172	16	1503	2261	2392
Brushøns	3376	342	686	1236	1112
Dobbeltbekkasin	4123	178	1091	1113	1741
Stor Kobbersneppe	17		11	4	2
Lille Kobbersneppe	2				2
Lille Regnspove	10		6	2	2
Stor Regnspove	274	44	115	94	21
Sortklire	140	34	19	50	37
Rødben	1071	268	259	261	283
Damklire	2				2
Hvidklire	787	25	275	247	240
Svaleklire	105	26	22	42	15
Tinksmed	139	11	8	61	59
Mudderklire	52	11		17	24
Odinshane	7	2	1	2	2
Hættemåge	6438	118	2861	942	2517
Stormmåge	648	2		375	271
Sølvmåge	290		3	231	56
Svartbag	5			4	1
Splitterne	6		6		
Fjordterne	23		17	5	1

Sortterne	1		1		
Ringdue	4	3	1		
Gøg	6	1			5
Mursejler	16	4		4	8
Grønspætte	1		1		
Stor Flagspætte	4		1	3	
Sanglærke	161	88	32	22	19
Digesvale	223	215		5	3
Landsvale	1081	435	1	525	120
Bysvale	23	20		2	1
Engpiber	137	2	25	10	100
Gul Vipstjert	43	8	6	15	14
Hvid Vipstjert	94	15		44	35
Gærdesmutte	5			1	4
Jernspurv	8		2	4	2
Rødhals	2			2	
Bynkefugl	3	3			
Stenpikker	1			1	
Solsort	4		2		2
Sjagger	3		3		
Misteldrossel	5		1	4	
Sivsanger	2	1			1
Kærsanger	3			2	1
Rørsanger	19	1	1	4	13
Gulbug	11		2	2	7
Gærdesanger	6	1	1	2	2
Tornsanger	5	2	2		1
Havesanger	2		1		1
Gransanger	5			2	3
Løvsanger	16		6	3	7
Skægmejse	7	6	1		
Topmejse	2			2	
Blåmejse	4			1	3
Musvit	2				2
Skovskade	1		1		
Husskade	1				1
Råge	3		2	1	
Gråkrage	69	18		3	48
Stær	8242	1067	200	2100	4875
Grønirisk	1				1
Stillits	6			6	
Tornirisk	328	227	1	100	
Bjergirisk	9				9
Gråsirken	1				1
Karmincompap	1			1	
Compap	4				4
Gulspurv	8	4	1	1	2
Rørspurv	16	3		5	8
Kornværbling	1				1

Sum tal for årene 92-95

Kolonne 2 viser den samlede sum for alle 4 år



ISBN 87-984892-2-4
ISSN 0902-7025

Hidtil udkomne numre i serien: "Ringkøbing Amts Fugleliv"

1. (1986) Niels Ulrich Pedersen: Ynglefugleregistreringer på Venø 1985
2. (1986) Egon Østergaard: Fugle ved Søby Sø og de omkringliggende brunkulsgreve 1960-85
3. (1986) Jens Overgaard Christensen: Status for ynglebestanden af måger og terner i Ringkøbing Amt
4. (1988) J. Hedegaard Christensen: Fugle på Borristerænet før og nu
5. (1988) Egon Østergaard: Natfugle i Ringkøbing Amt 1986-87
6. (1988) Bo Daugård: Fuglelokaliteter i Ikast Kommune
7. (1991) Ebba Alstrup og Bo Daugård: Hørbylunde i tegninger og tekst
8. (1992) Jan Østerby Olesen: Søby Sø området. Fugleobservationer 1991
9. (1992) Fugle & Natur - En guide til Vestjylland. Red. Leif Novrup & Egon Østergaard
10. (1993) Carsten G. Laursen: Fuglelivet i Gødstrup Sø. Udvikling og status
11. (1994) Niels P. Brøgger & Bo Daugård: I Natravnens rige - Fuglelivet i Nørlund Plantage og Harrild Hede.
(Tillæg om det øvrige dyreliv)
12. (1996) Henning Rose Sørensen - Leif Novrup: Geddal Strandenge
Statusrapport over fuglelivet 1992 - 1995